


ダコレート水和剤

ダコニール1000


ダコニール粉剤



※ダコニール1000、ダコニール粉剤には適用登録がありません

※ダコニール1000、ダコニール粉剤には適用登録がありません

健全な苗づくりに欠かせない一手!



稲・箱育苗用殺菌剤

ダコレート水和剤

ダコニール1000

ダコニール粉剤

●有効成分:TPN……50.0%
ペノミル…20.0%

●有効成分:TPN…40.0%

●有効成分:TPN…4.0%

薬剤名	リゾプス菌による苗立枯病	フザリウム菌による苗立枯病	トリコデルマ菌による苗立枯病	いもち病(苗いもち)
ダコレート水和剤	●	●	●	●
ダコニール1000	●	—	—	—
ダコニール粉剤	●	—	—	—
発生条件	①土壌中、植物残さ、育苗資材等に広く分布 ②高温、高湿、密播等で急速に繁殖	①土壌中に広く分布 ②低温や土壌の乾湿のくり返し等で苗が衰弱した場合	①土壌中、植物残さ等に広く分布 ②酸性(pH4以下)土壌 ③保水力の小さい土壌 ④緑化開始時の低温	①汚染もみや被害わらが第一次伝染源 ②低温、多湿、日照不足、多窒素が発病を助長

●登録あり、—登録なし

ダコニールは(株)エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。
ダコレートは(株)エス・ディー・エス バイオテックと住友化学(株)の登録商標です。

TPNを含む農薬の稲(箱育苗)に対する適用内容 使用前にはラベルを必ずよく読んでください。

薬剤名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用液量	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数	ペノミルを含む農薬の総使用回数
ダコレート水和剤	いもち病(苗いもち)	400倍	は種時	1回	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り0.5ℓ	灌注	2回以内	2回以内 (種子への処理は1回以内、床土への混和は1回以内)
	苗立枯病(リゾプス菌、トリコデルマ菌、フザリウム菌)	400~600倍 800~1200倍	は種時から緑化期 但し、 は種14日後まで	2回以内	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り1ℓ			

※緑化期に使用する場合、発病後の処理では効果が劣ることがあるので注意してください。

薬剤名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用液量	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
ダコニール1000	苗立枯病(リゾプス菌)	500~1000倍 1000~2000倍	は種時から緑化期 但し、 は種14日後まで	2回以内	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り0.5ℓ 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り1ℓ	土壌灌注	2回以内

※緑化期に使用する場合、発病後の処理では効果が劣ることがあるので注意してください。

薬剤名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
ダコニール粉剤	苗立枯病(リゾプス菌)	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り15~20g	は種前	1回	育苗箱 土壌に均一に混和する	2回以内

2017年9月現在の登録内容です。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。
●空袋・空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。ボトルは3回以上洗浄し、洗浄水はタンクにいれてください。